關於中風

繁體中文資料頁




About Stroke - Fact Sheet (Chinese Traditional)

什麽是中風?

中風攻擊大腦,而大腦控制著人的身體。大腦需要 血液中攜帶的氧氣和營養素。當大腦無法獲得所需 的血液時,就會發生中風。


當腦細胞沒有得到足夠的血液時,它們就會快速死亡。每分鐘可能有多達190萬個腦細胞死亡。

中風有兩種類型:



缺血性腦中風

(英文為Ischaemic, 發音同"is-key-mick") 血凝塊或斑塊阻塞動脈



出血性腦中風

(英文為Haemorrhagic, 發音同"hemm-orr-ragic") 動脈斷裂或爆裂

每次中風都不一樣。中風如何影響一個人取決於它在大腦中發生的位置,以及中風的程度大小。

中風可以影響一個人的身體、他們的情緒以及他們 的思維方式。它能夠導致肌肉無力,以及言語、記 憶、聽覺或視力方面的問題。

中風在任何情況下都是一種醫療緊急狀況。

一旦發現中風徵兆,應立即撥打三個零(000)。

TIA有何不同?

TIA是指短暫性腦缺血發作。當您的大腦血液供應短時間阻塞時,就會發生TIA。TIA與中風有相同的徵兆,但這些徵兆會自行消失。這些徵兆通常只會持續幾分鐘。

絕對不要忽視TIA。即便徵兆已經消失而您感覺好轉,也要立即撥打三個零(000)。



中風的徵兆

面部——檢查他們的面部。他們的嘴巴是否下垂?

雙臂——他們可以抬起雙臂嗎?

言語——他們是否言語不清?他們聽得懂

您説話嗎?

時間——時間至關重要。如果您發現了任何此類徵 兆,請立即撥打三個零(000)。

與家人和朋友分享F.A.S.T.消息。

健康生活的5個秘訣



抽出時間進行健康 檢查

請定期到您的醫生處檢查,瞭解您是否有中風的 風險因素。如果您已超 過45歲,這一點就更為 重要。

- , 要求進行血壓檢查。高血壓是中風的最大風險因素。 沒有醫生或藥劑師的測試,您無法判斷您是否患有高血 壓。測試很快,也不疼。
- , 檢查膽固醇水準。讓您的醫生檢查您的血液中的膽固醇 是否過高。您可以通過不食用飽和脂肪來降低膽固醇, 例如動物脂肪。
- 就糖尿病諮詢您的醫生。您可以通過健康飲食、規律運動和檢查血糖水準來控制2型糖尿病。
- , 檢查是否脈律不齊。房顫是指您的心臟無法以平穩的方式搏動。就如何治療房顫諮詢您的醫生。



健康飲食

不良飲食會導致高血壓、 高血脂、糖尿病、心髒病 和中風。健康飲食對降低 中風風險很重要。

- ▶ 平衡飲食。多吃水果、穀物、蔬菜、瘦肉、家禽、魚、 減脂牛奶和優酪乳。 少吃動物脂肪。
- 少吃鹽。閱讀包裝食品上的標籤,瞭解其中的鈉含量。
- **> 更換糖的種類**。吃堅果或新鮮水果,而不是甜點。用水 代替含糖飲料。
- 吃新鮮食品。從市場裡購買新鮮食品。少吃加工食品。



多活動

不活動、超重或體內脂肪 過多會導致高血壓和高 膽固醇。經常鍛煉。

- 步行。去散步或徒步履行,而不是開車。試著以比平常 更快的速度走路。
- **報名參加每週課程**。例如,您可以參加舞蹈、健美操或 運動量訓練課程。
- **> 參加戶外活動**。享受戶外活動,如騎自行車、游泳或做 園藝。



只適量飲酒

飲酒過多會提高中風的 風險。

- 飲酒之前三思。經常飲用大量酒精會導致高血壓並增加中風的風險。
- 最多喝兩杯。每天飲用不超過兩標準杯酒精飲料。



戒煙

吸煙會提高血壓並減少進 入大腦的氧氣。吸煙會增 加中風的風險。

- ,戒煙對您有立竿見影的好處。戒煙後的最初24小時內,您的身體便開始修復。心髒病發作和中風的風險會立即開始下降。
- 在戒煙的一個月以內,您的血壓可以恢復正常。

關於Stroke Foundation

Stroke Foundation是一家全國性的慈善機構,與社區合作預防中風、拯救生命和促進康復。

- **StrokeLine 1800 STROKE (1800 787 653)**
- ☐ strokefoundation.org.au
- f /strokefoundation
- @strokefdn
- © @strokefdn